

DZIECKO PONIŻEJ 1 MIESIĄCA

WAGA 3 KG

DOLNA GRANICA RR	76/40mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	50/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	140/min
POZIOM GLUKOZY	40-90mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	3.0 na 9 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka prosta 1
MASKA KRTANIOWA	Nr 1
DEFIBRYLACJA	12J łyżki pediatryczne
KARDIOWERSJA	3J; następnie 6J
ADRENALINA	0.3ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	3ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	0.5ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	1.5 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	3ml (w 100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	0.6ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 0.1ml; wlewka 2mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	0.3ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	0.3ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	7.5ml
GLUKAGON	Nierzydatny
WLEW 0.9% NaCl	30-60ml

DZIECKO 1 MIESIĘCZNE

WAGA 4 KG

DOLNA GRANICA RR	70/40mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	30/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	130/min
POZIOM GLUKOZY	60-100mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	3.5 na 10 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka prosta 1
MASKA KRTANIOWA	Nr 1
DEFIBRYLACJA	16J łyżki pediatryczne
KARDIOWERSJA	4J; następnie 8J
ADRENALINA	0.4ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	4ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	0.5ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	1.5 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	4ml (w 100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	0.8ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 0.2ml; wlewka 2mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	0.4ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	0.4ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	10ml
GLUKAGON	0.5mg
WLEW 0.9% NaCl	80ml

DZIECKO 2 MIESIĘCZNE

WAGA 5 KG

DOLNA GRANICA RR	70/40mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	30/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	130/min
POZIOM GLUKOZY	60-100mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	3.5 na 10 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka prosta 1
MASKA KRTANIOWA	Nr 1.5
DEFIBRYLACJA	20J łyżki pediatryczne
KARDIOWERSJA	5J; następnie 10J
ADRENALINA	0.5ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	5ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	0.5ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	1.5 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	5ml (w 100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	1ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 0.2ml; wlewka 2.5mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	0.5ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	0.5ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	12.5ml
GLUKAGON	0.5mg
WLEW 0.9% NaCl	100ml

DZIECKO 3 MIESIĘCZNE

WAGA 6 KG

DOLNA GRANICA RR	70/40mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	30/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	130/min
POZIOM GLUKOZY	60-100mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	3.5 na 10 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka prosta 1
MASKA KRTANIOWA	Nr 1.5
DEFIBRYLACJA	24J łyżki pediatryczne
KARDIOWERSJA	6J; następnie 12J
ADRENALINA	0.6ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	6ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	0.6ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	1.5 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	6ml (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	1.2ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 0.3ml; wlewka 2.5mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	0.6ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	0.6ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	15ml
GLUKAGON	0.5mg
WLEW 0.9% NaCl	120ml

DZIECKO 4 MIESIĘCZNE

WAGA 7 KG

DOLNA GRANICA RR	70/40mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	30/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	130/min
POZIOM GLUKOZY	60-100mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	3.5 na 10 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka prosta 1
MASKA KRTANIOWA	Nr 1.5
DEFIBRYLACJA	28J łyżki pediatryczne
KARDIOWERSJA	7J; następnie 14J
ADRENALINA	0.7ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	7ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	0.7ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	1.5 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	7ml (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	1.4ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 0.3ml; wlewka 3.5mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	0.7ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	0.7ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	17.5ml
GLUKAGON	0.5mg
WLEW 0.9% NaCl	140ml

DZIECKO 5 MIESIĘCZNE

WAGA 8 KG

DOLNA GRANICA RR	70/50mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	30/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	120/min
POZIOM GLUKOZY	60-100mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	3.5 na 10 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka prosta 1
MASKA KRTANIOWA	Nr 1.5
DEFIBRYLACJA	32J łyżki pediatryczne
KARDIOWERSJA	8J; następnie 16J
ADRENALINA	0.8ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	8ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	0.8ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	1.5 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	8ml (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	1.6ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 0.4ml; wlewka 4mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	0.8ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	0.8ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	20ml
GLUKAGON	0.5mg
WLEW 0.9% NaCl	160ml

DZIECKO 6 MIESIĘCZNE

WAGA 8 KG

DOLNA GRANICA RR	70/50mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	30/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	120/min
POZIOM GLUKOZY	60-100mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	3.5 na 10 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka prosta 1
MASKA KRTANIOWA	Nr 1.5
DEFIBRYLACJA	32J łyżki pediatryczne
KARDIOWERSJA	8J; następnie 16J
ADRENALINA	0.8ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	8ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	0.8ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	1.5 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	8ml (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	1.6ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 0.4ml; wlewka 4mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	0.8ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	0.8ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	20ml
GLUKAGON	0.5mg
WLEW 0.9% NaCl	160ml

DZIECKO 7 MIESIĘCZNE

WAGA 8 KG

DOLNA GRANICA RR	70/50mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	30/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	120/min
POZIOM GLUKOZY	60-100mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	3.5 na 10 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka prosta 1
MASKA KRTANIOWA	Nr 1.5
DEFIBRYLACJA	32J łyżki pediatryczne
KARDIOWERSJA	8J; następnie 16J
ADRENALINA	0.8ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	8ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	0.8ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	1.5 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	8ml (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	1.6ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 0.4ml; wlewka 4mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	0.8ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	0.8ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	20ml
GLUKAGON	0.5mg
WLEW 0.9% NaCl	160ml

DZIECKO 8 MIESIĘCZNE

WAGA 9 KG

DOLNA GRANICA RR	70/50mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	30/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	120/min
POZIOM GLUKOZY	60-100mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	4.0 na 11 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka prosta 1
MASKA KRTANIOWA	Nr 1.5
DEFIBRYLACJA	36J łyżki pediatryczne
KARDIOWERSJA	9J; następnie 18J
ADRENALINA	0.9ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	9ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	0.9ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	1.5 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	9ml (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	1.8ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 0.4ml; wlewka 4.5mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	0.9ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	0.9ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	22.5ml
GLUKAGON	0.5mg
WLEW 0.9% NaCl	180ml

DZIECKO 9 MIESIĘCZNE

WAGA 9 KG

DOLNA GRANICA RR	70/50mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	30/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	120/min
POZIOM GLUKOZY	60-100mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	4.0 na 11 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka prosta 1
MASKA KRTANIOWA	Nr 1.5
DEFIBRYLACJA	36J łyżki pediatryczne
KARDIOWERSJA	9J; następnie 18J
ADRENALINA	0.9ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	9ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	0.9ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	1.5 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	9ml (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	1.8ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 0.4ml; wlewka 4.5mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	0.9ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	0.9ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	22.5ml
GLUKAGON	0.5mg
WLEW 0.9% NaCl	180ml

DZIECKO 10 MIESIĘCZNE

WAGA 9 KG

DOLNA GRANICA RR	70/50mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	30/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	120/min
POZIOM GLUKOZY	60-100mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	4.0 na 11 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka prosta 1
MASKA KRTANIOWA	Nr 1.5
DEFIBRYLACJA	36J łyżki pediatryczne
KARDIOWERSJA	9J; następnie 18J
ADRENALINA	0.9ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	9ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	0.9ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	1.5 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	9ml (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	1.8ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 0.4ml; wlewka 4.5mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	0.9ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	0.9ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	22.5ml
GLUKAGON	0.5mg
WLEW 0.9% NaCl	180ml

DZIECKO 11 MIESIĘCZNE

WAGA 10 KG

WAGA	10kg
DOLNA GRANICA RR	70/50mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	30/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	120/min
POZIOM GLUKOZY	60-100mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	4.0 na 11 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka prosta 1
MASKA KRTANIOWA	Nr 1.5
DEFIBRYLACJA	40J łyżki pediatryczne
KARDIOWERSJA	10J; następnie 20J
ADRENALINA	1ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	10ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	1ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	1.5 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	10ml (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	2ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 0.5ml; wlewka 5mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	1ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	1ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	25ml
GLUKAGON	0.5mg
WLEW 0.9% NaCl	200ml
CLEMASTIN	Nie stosuje się u dzieci
KETONAL	Nie zalecany jest u dzieci
PARACETAMOL	Czopek 80mg; 10-15mg/kg po
MIDAZOLAM	1ml (5mg w 5 ml soli)
FENTANYL	1ml (0.1mg w 10ml soli)
NAHCO3	10ml NaHCO3 +8ml 5%glukozy

DZIECKO 1 ROCZNE

WAGA 10 KG

DOLNA GRANICA RR	70/50mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	30/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	115/min
POZIOM GLUKOZY	60-100mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	4.0 na 11 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka prosta 1
MASKA KRTANIOWA	Nr 1.5
DEFIBRYLACJA	40J łyżki pediatryczne
KARDIOWERSJA	10J; następnie 20J
ADRENALINA	1ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	10ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	1ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	1.5 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	10ml (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	2ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 0.5ml; wlewka 5mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	1ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	1ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	25ml
GLUKAGON	0.5mg
WLEW 0.9% NaCl	200ml
CLEMASTIN	Nie stosuje się u dzieci
KETONAL	Nie zalecany jest u dzieci
PARACETAMOL	Czopek 80mg; 10-15mg/kg po
MIDAZOLAM	1ml (5mg w 5 ml soli)
FENTANYL	1ml (0.1mg w 10ml soli)
NAHCO3	10ml NaHCO3 +8ml 5%glukozy

DZIECKO 1.5 ROCZNE

WAGA 11 KG

WAGA	11kg
DOLNA GRANICA RR	70/50mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	30/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	115/min
POZIOM GLUKOZY	70-105mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	4.5 na 12 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka prosta 1
MASKA KRTANIOWA	Nr 2
DEFIBRYLACJA	44J łyżki pediatryczne
KARDIOWERSJA	11J; następnie 20J
ADRENALINA	1.1ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	11ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	1.1ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	1.5 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	11ml (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	2.2ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 0.5ml; wlewka 5mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	1.1ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	1.1ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	27.5ml
GLUKAGON	0.5mg
WLEW 0.9% NaCl	220ml
CLEMASTIN	Nie stosuje się u dzieci
KETONAL	Nie zalecany jest u dzieci
PARACETAMOL	Czopek 80mg; 10-15mg/kg po
MIDAZOLAM	1.1ml (5mg w 5 ml soli)
FENTANYL	1.1ml (0.1mg w 10ml soli)
NAHCO3	10ml NaHCO3 +10ml 5%glukozy

DZIECKO 2 ROCZNE

WAGA 12 KG

DOLNA GRANICA RR	74/50mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	30/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	115/min
POZIOM GLUKOZY	70-105mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	4.5 na 12 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka prosta 1
MASKA KRTANIOWA	Nr 2
DEFIBRYLACJA	48J łyżki pediatryczne
KARDIOWERSJA	12J; następnie 24J
ADRENALINA	1.2ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	12ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	1.2ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	1.5 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	12ml (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	2.4ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 0.6ml; wlewka 5mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	1.2ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	1.2ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	30ml
GLUKAGON	0.5mg
WLEW 0.9% NaCl	240ml
CLEMASTIN	Nie stosuje się u dzieci
KETONAL	Nie zalecany jest u dzieci
PARACETAMOL	Czopek 125mg; 10-15mg/kg po
MIDAZOLAM	1.2ml (5mg w 5 ml soli)
FENTANYL	1.2ml (0.1mg w 10ml soli)
NAHCO3	12ml NaHCO3 +10ml 5%glukozy

DZIECKO 3 ROCZNE

WAGA 14 KG

DOLNA GRANICA RR	80/60mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	25/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	110/min
POZIOM GLUKOZY	70-105mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	5.0 na 14 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	Łyżka prosta 2
MASKA KRTANIOWA	Nr 2
DEFIBRYLACJA	56J łyżki pediatryczne
KARDIOWERSJA	14J; następnie 28J
ADRENALINA	1.4ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	14ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	1.4ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	1.5 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	14ml (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	2.4ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 0.7ml; wlewka 5mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	1.4ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	1.4ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	35ml
GLUKAGON	0.5mg
WLEW 0.9% NaCl	280ml
CLEMASTIN	Nie stosuje się u dzieci
KETONAL	Nie zalecany jest u dzieci
PARACETAMOL	Czopek 125mg; 10-15mg/kg po
MIDAZOLAM	1.4ml (5mg w 5 ml soli)
FENTANYL	1.4ml (0.1mg w 10ml soli)
NAHCO3	14ml NaHCO3 +10ml 5%glukozy

DZIECKO 4 LETNIE

WAGA 16 KG

DOLNA GRANICA RR	80/60mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	20/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	100/min
POZIOM GLUKOZY	70-105mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	5.0 na 14 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka prosta 2
MASKA KRTANIOWA	Nr 2
DEFIBRYLACJA	64J łyżki pediatryczne
KARDIOWERSJA	16J; następnie 32J
ADRENALINA	1.6ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	16ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	1.6ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	1.5 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	16ml (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	3.2ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 0.8ml; wlewka 10mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	1.6ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	1.6ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	40ml
GLUKAGON	0.5mg
WLEW 0.9% NaCl	320ml
CLEMASTIN	Nie stosuje się u dzieci
KETONAL	Nie zalecany jest u dzieci
PARACETAMOL	Czopek 250mg; 10-15mg/kg po
MIDAZOLAM	1.6ml (5mg w 5 ml soli)
FENTANYL	1.6ml (0.1mg w 10ml soli)
NAHCO3	16ml NaHCO3 +10ml 5%glukozy

DZIECKO 5 LETNIE

WAGA 18 KG

DOLNA GRANICA RR	80/60mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	20/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	100/min
POZIOM GLUKOZY	70-105mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	5.5 na 14 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka prosta 2
MASKA KRTANIOWA	Nr 2
DEFIBRYLACJA	72J łyżki pediatryczne
KARDIOWERSJA	18J; następnie 36J
ADRENALINA	1.8ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	18ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	1.6ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	1.5 kresczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	18ml (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	3.6ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 0.9ml; wlewka 10mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	1.8ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	1.8ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	45ml
GLUKAGON	0.5mg
WLEW 0.9% NaCl	360ml
CLEMASTIN	Nie stosuje się u dzieci
KETONAL	Nie zalecany jest u dzieci
PARACETAMOL	Czopek 250mg; 10-15mg/kg po
MIDAZOLAM	1.8ml (5mg w 5 ml soli)
FENTANYL	1.8ml (0.1mg w 10ml soli)
NAHCO3	18ml NaHCO3 +10ml 5%glukozy

DZIECKO 6 LETNIE

WAGA 20 KG

DOLNA GRANICA RR	85/60mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	20/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	100/min
POZIOM GLUKOZY	70-105mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	5.5 na 16 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka prosta 2
MASKA KRTANIOWA	Nr 2
DEFIBRYLACJA	80J łyżki pediatriczne
KARDIOWERSJA	20J; następnie 40J
ADRENALINA	2ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	20ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	2ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	3 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	100mg (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	4ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 1ml; wlewka 10mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	2ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	2ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	50ml
GLUKAGON	0.5mg
WLEW 0.9% NaCl	400ml
CLEMASTIN	Nie stosuje się u dzieci
KETONAL	Nie zalecany jest u dzieci
PARACETAMOL	Czopek 250mg; 10-15mg/kg po
MIDAZOLAM	2ml (5mg w 5 ml soli)
FENTANYL	2ml (0.1mg w 10ml soli)
NAHCO3	20ml NaHCO3 +10ml 5%glukozy

DZIECKO 7 LETNIE

WAGA 22 KG

DOLNA GRANICA RR	85/60mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	20/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	90/min
POZIOM GLUKOZY	70-105mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	6.0 na 18 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka zakrzywiona 2 lub 3
MASKA KRTANIOWA	Nr 2.5
DEFIBRYLACJA	88J łyżki pediatryczne
KARDIOWERSJA	22J; następnie 44J
ADRENALINA	2.2ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	22ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	2.2ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	3 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	100mg (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	4.4ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 1ml; wlewka 10mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	2.2ml (10mg w 10ml soli)
NALOKSON	2.2ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	55ml
GLUKAGON	0.5mg
WLEW 0.9% NaCl	440ml
CLEMASTIN	Nie stosuje się u dzieci
KETONAL	Nie zalecany jest u dzieci
PARACETAMOL	Czopek 250mg; 10-15mg/kg po
MIDAZOLAM	2.2ml (5mg w 5 ml soli)
FENTANYL	2.2ml (0.1mg w 10ml soli)
NAHCO3	22ml NaHCO3 +10ml 5%glukozy

DZIECKO 8 LETNIE

WAGA 25 KG

WAGA	25kg
DOLNA GRANICA RR	90/70mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	20/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	90/min
POZIOM GLUKOZY	70-105mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	6.0 na 18 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka zakrzywiona 2 lub 3
MASKA KRTANIOWA	Nr 2.5
DEFIBRYLACJA	100J łyżki zwykłe
KARDIOWERSJA	25J; następnie 50J
ADRENALINA	2.5ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	22ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	2.2ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	3 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	100mg (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	4.4ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 1ml; wlewka 10mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	Dawki frakcjonowane po 2mg
NALOKSON	2.5ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	62.5ml
GLUKAGON	1mg
WLEW 0.9% NaCl	500ml
CLEMASTIN	Nie stosuje się u dzieci
KETONAL	Nie zalecany jest u dzieci
PARACETAMOL	Czopek 250mg; 10-15mg/kg po
MIDAZOLAM	2.5ml (5mg w 5 ml soli)
FENTANYL	2.5ml (0.1mg w 10ml soli)
NAHCO3	25ml NaHCO3 +10ml 5%glukozy

DZIECKO 9 LETNIE

WAGA 28 KG

DOLNA GRANICA RR	90/70mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	20/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	80/min
POZIOM GLUKOZY	70-105mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	6.0 na 18 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka zakrzywiona 2 lub 3
MASKA KRTANIOWA	Nr 2.5
DEFIBRYLACJA	112J łyżki zwykłe
KARDIOWERSJA	28J; następnie 56J
ADRENALINA	2.8ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	28ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	2.8ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	3 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	100mg (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	5.6ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 1.4ml; wlewka 10mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	Dawki frakcjonowane po 2mg
NALOKSON	2.8ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	70ml
GLUKAGON	1mg
WLEW 0.9% NaCl	500ml
CLEMASTIN	Nie stosuje się u dzieci
KETONAL	Nie zalecany jest u dzieci
PARACETAMOL	Czopek 250mg; 10-15mg/kg po
MIDAZOLAM	2.8ml (5mg w 5 ml soli)
FENTANYL	2.8ml (0.1mg w 10ml soli)
NAHCO3	28ml NaHCO3 +10ml 5%glukozy

DZIECKO 10 LETNIE

WAGA 33 KG

DOLNA GRANICA RR	90/70mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	16/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	80/min
POZIOM GLUKOZY	70-105mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	6.5 na 20 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka zakrzywiona 2 lub 3
MASKA KRTANIOWA	Nr 3
DEFIBRYLACJA	132J łyżki zwykłe
KARDIOWERSJA	33J; następnie 66J
ADRENALINA	3.3ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	33ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	3.3ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	3 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	100mg (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	6.6ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 1.6ml; wlewka 10mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	Dawki frakcjonowane po 2mg
NALOKSON	3.3ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	82.5ml
GLUKAGON	1mg
WLEW 0.9% NaCl	500ml
CLEMASTIN	Nie stosuje się u dzieci
KETONAL	Nie zalecany jest u dzieci
PARACETAMOL	Czopek 500mg; 10-15mg/kg po
MIDAZOLAM	3.3ml (5mg w 5 ml soli)
FENTANYL	3.3ml (0.1mg w 10ml soli)
NAHCO3	33ml NaHCO3 +10ml 5%glukozy

DZIECKO 11 ROCZNE

WAGA 36 KG

DOLNA GRANICA RR	90/70mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	16/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	80/min
POZIOM GLUKOZY	70-105mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	6.5 na 20 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka zakrzywiona 2 lub 3
MASKA KRTANIOWA	Nr 3
DEFIBRYLACJA	145J łyżki zwykłe
KARDIOWERSJA	36J; następnie 72J
ADRENALINA	3.6ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	36ml (100mg do 20ml 5%glukozy)
ATROPINA	3.6ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	3 kreseczki bez rozcieńczenia (0.15mg im)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	100mg (100mg w 20ml soli)
MAGNEZ 20%	7.2ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 1.8ml; wlewka 10mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	Dawki frakcjonowane po 2mg
NALOKSON	3.6ml (1amp 0.4mg w 4ml soli)
GLUKOZA 20%	90ml
GLUKAGON	1mg
WLEW 0.9% NaCl	500ml
CLEMASTIN	Nie stosuje się u dzieci
KETONAL	Nie zalecany jest u dzieci
PARACETAMOL	Czopek 500mg; 10-15mg/kg po
MIDAZOLAM	3.6ml (5mg w 5 ml soli)
FENTANYL	3.6ml (0.1mg w 10ml soli)
NAHCO3	36ml NaHCO3 +10ml 5%glukozy

DZIECKO 12 LETNIE

WAGA 40 KG

DOLNA GRANICA RR	95/70mmg
PRAWIDŁOWY ODDECH	16/min
PRAWIDŁOWE TĘTNO	80/min
POZIOM GLUKOZY	70-105mg/dl
RURKA INTUBACYJNA	7.0 na 22 cm bez mankietu
LARYNGOSKOP	łyżka zakrzywiona 2 lub 3
MASKA KRTANIOWA	Nr 3
DEFIBRYLACJA	160J łyżki zwykłe
KARDIOWERSJA	40J; następnie 80J
ADRENALINA	4ml (1mg do 10ml soli)
AMIODARON	300mg w 20ml5%glukozy
ATROPINA	4ml (2mg w 10ml soli)
ADRENALINA ANAFILAKSJA	0.5mg im (0.5ml)
SALBUTAMOL	5 mg w nebulizacji
HYDROKORTYZON	200mg
MAGNEZ 20%	8ml we wlewie
RELANIUM	i.v. 2ml; wlewka 10mg pr
CLONAZEPAM	0.5mg w 5ml soli powoli
MORFINA	Dawki frakcjonowane po 2mg
NALOKSON	1amp 0.4mg
GLUKOZA 20%	100ml
GLUKAGON	1mg
WLEW 0.9% NaCl	500ml
CLEMASTIN	Nie stosuje się u dzieci
KETONAL	Nie zalecany jest u dzieci
PARACETAMOL	Czopek 500mg; 10-15mg/kg po
MIDAZOLAM	4ml (5mg w 5 ml soli)
FENTANYL	4ml (0.1mg w 10ml soli)
NAHCO3	40ml